

Sclérose en plaques

Traitement par TERIFLUNOMIDE 14 mg

(Aubagio® - SANOFI GENZYME)

Disponible en France depuis octobre 2014

Génériqué depuis 2023



Cette plaquette a été réalisée par la filière SEP de



Dans quel cas TERIFLUBOMIDE est-il utilisé ?

TERIFLUNOMIDE est utilisé chez les patients atteints de sclérose en plaques de forme rémittente (évoluant par poussée).

Comment agit-il ?

TERIFLUNOMIDE contribue à protéger le système nerveux central des attaques du système immunitaire en limitant la prolifération de certains globules blancs (lymphocytes) responsable de l'inflammation.

Comment est-il administré ?

Un comprimé par jour à heure régulière pour éviter les oublis (à prendre pendant ou en dehors des repas).

Prescription réservée aux neurologues.



Que faire avant l'instauration du traitement ?

Votre neurologue s'assurera de :

- L'absence d'insuffisance rénale, hépatique,
- L'absence de traitement concomitant,
- L'absence d'une grossesse,
- La mise à jour du calendrier vaccinal.

Contre-indications

Le traitement est **contre indiqué pendant la grossesse**.

Les femmes en âge de procréer doivent utiliser une **contraception pendant le traitement**.

En cas de projet de grossesse, parlez-en avec votre neurologue.

L'allaitement est **contre indiqué pendant le traitement**.



Quels sont les effets indésirables éventuels ?

- Amincissement de la chevelure,
- Nausées, diarrhées,
- Perturbation du bilan hépatique, baisse des globules blancs,
- Hypertension artérielle,
- Réactions cutanées.

Quelle surveillance ?

- Surveillance biologique à faire en laboratoire ou par infirmière à domicile à M1, M2, M3, M4, M5, M6 puis tous les 2 mois.
- Consulter rapidement en cas de réaction cutanée, ou suspicion de grossesse. Un traitement pour éliminer plus rapidement le TERIFLUNOMIDE peut être prescrit.

Que faire en cas d'oubli ?

En cas d'oubli d'une prise, prenez-le comprimé dès que vous vous en apercevez. Si vous vous apercevez de l'oubli plus de 6 heures après la prise habituelle, sautez la dose oubliée et prenez votre comprimé à l'heure habituelle le lendemain.

Ne doublez pas la dose suivante pour compenser l'oubli.

Ce document est rédigé dans un but pédagogique, avec un langage accessible à tous, pour mémoriser les principales caractéristiques du médicament.

Pour une information complète se reporter à la fiche RCP (Résumé des Caractéristiques du Produit) ou au site internet : <http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/>

Cette plaquette a été mise à jour en janvier 2024